

Patienteninformation zur Behandlung von Krätze (Scabies)

1. Erwachsene (ab 14 Jahren, außer schwangere Frauen)

- Anwendung von Permethrin (Infectoscab®) auf den ganzen Körper, abends nach dem Duschen, außer auf den Kopf.

Speziell zu behandeln sind die folgenden Stellen:

Zehen- und Fingerzwischenräume	Achtung: Keine Anwendung von Permethrin (Infectoscab®) auf Schleimhäute, Mund oder Augen.
Hand- und Fußgelenksregion	
Ellbogen	
Bauchnabel und Achselhöhlen	
Gesäßfalte	
Genitalregion bei den Männern	
Brustwarzenregion bei den Frauen	

Vorgehen:

- Duschen sie lauwarm. Dann cremen Sie sich ein und belassen das Produkt auf den behandelten Stellen für 12 Stunden. Falls Sie sich die Hände nachts waschen: diese erneut eincremen.

Dann für 4 Tage:

- Täglich Duschen, danach ziehen Sie täglich saubere Unterwäsche an.
- Täglich die Bettwäsche wechseln und bei 60 Grad waschen.

Zusätzliche Maßnahmen:

- Gleichzeitige Behandlung von allen Leuten, die im gleichen Haushalt wohnen.
- Keine sexuelle Beziehung während der Behandlung mit jemandem, der nicht behandelt wird.
- Nicht das gleiche Bett benutzen wie eine andere Person, die nicht behandelt wird.
- Wechseln von Unterwäsche, Socken und Bettwäsche nach der letzten Dusche nach Beendigung der Behandlung und Waschen von allen Sachen bei 60 Grad in der Waschmaschine.
- Andere, ungetragene, schon gereinigte und gewaschene Kleidungsstücke müssen nicht gewaschen werden.
- Wenn der Patient in einem Bett ohne Bettlaken schläft, müssen auch die Matratze und der Überzug desinfiziert werden (z.B. mit „Bio Kill Insektenspray“ oder einem anderen Produkt gegen Parasiten)

Wichtig:

Die Übertragung erfolgt über engen Körperkontakt, Bettwäsche und Unterwäsche.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, so wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns.

Ihr Praxisteam